

GE224 過敏原檢測報告

姓 名 林澤巖


性 別

病 歷 號 A132231

報告日期 2016/4/15

醫療院所 王群光自然診所 醫師

Allergen Screen by
Protein Chip
Microarray



本報告僅供醫師參考


GE224 過敏原檢測報告

姓名：林澤嚴

病歷號：A132231

日期：2016/4/15

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | IgE急性過敏反應指標 | | IgG慢性過敏反應指標 |
|--|--------------------|--|--------------------|




GE224 過敏原檢測報告

姓名：林澤嚴

病歷號：A132231

日期：2016/4/15







GE224 過敏原檢測報告

姓名：林澤嚴

病歷號：A132231

日期：2016/4/15

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | IgE急性過敏反應指標 | | IgG慢性過敏反應指標 |
|--|--------------------|--|--------------------|



GE224 過敏原檢測報告

姓名：林澤巖

病歷號：A132231

日期：2016/4/15

IgE急性過敏反應圖譜

| IgE急性過敏反應圖譜 | | |
|-------------|----|-----------------|
| 重度 | 6級 | |
| 重度 | 5級 | |
| 中度 | 4級 | |
| 中度 | 3級 | |
| 輕度 | 2級 | |
| 輕度 | 1級 | 青黴菌；屋塵蟎；粉塵蟎；鰻魚； |

檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

1. 一般以3級以上認定為可能之過敏原，有些醫師認為2級以上就應該注意。
2. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，都應該避免食用。
3. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示在食用後兩小時內，並未誘發嚴重急性過敏症狀，仍然必須避免食用或減少服用次數。

〔註〕 即使檢測結果未顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示食用後會誘發急性過敏症狀，亦應該嚴格避免食用。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀

GE224 過敏原檢測報告

姓名：林澤巖

病歷號：A132231

日期：2016/4/15

IgG慢性過敏反應圖譜

| IgG慢性過敏反應圖譜 | | |
|-------------|----|---|
| 重度 | 6級 | 牛奶；優格；蛋黃；黃豆；花生； |
| 重度 | 5級 | 起司；鱈魚；鮭魚；高麗菜；花椰菜；四季豆；豌豆夾；南瓜；蘿蔔；洋蔥；杏仁；大蒜； |
| 中度 | 4級 | 蛋白；鰻魚；菠菜；青椒；茄子；小黃瓜；竹筍；胡蘿蔔；小麥；蕎麥；胡桃核桃；蔥；香菜； |
| 中度 | 3級 | 馬鈴薯；蕃茄；鳳梨；櫻桃；葡萄；葡萄柚；芭樂；草莓；香瓜；玉米；綠豆；紅豆；花豆；葵花籽；蜂蜜；白胡椒；甘草；當歸；蓮子； |
| 輕度 | 2級 | 鴨肉；蚌；萵苣；芹菜；蘆筍；地瓜；檸檬；水蜜桃；西瓜；茶；咖哩；辣椒；黃耆；紅棗； |
| 輕度 | 1級 | 雞肉；牡蠣；芋頭；蘋果；柑橘；椰子；梨；米飯；芝麻；薑；九層塔；枸杞；川芎；熟地黃； |

檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

IgG慢性食物過敏後續飲食建議

1. 重度反應：建議停止攝食6個月，之後每隔4天才攝食1次。
2. 中度反應：建議停止攝食3個月，之後每隔4天攝食1次，3個月後再正常攝食。
3. 輕度反應：2級：建議每隔4天才攝食1次，3個月後正常攝食。
1級：避免每日大量食用，原則上可以安心攝食。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀