

GE224 過敏原檢測報告

姓 名 葉家娣


性 別

病 歷 號 63356

報告日期 2016/6/21

醫療院所 陽光耳鼻喉科診所 醫師

Allergen Screen by
Protein Chip
Microarray



本報告僅供醫師參考


GE224 過敏原檢測報告

姓名：葉家娣

病歷號：63356

日期：2016/6/21

	IgE急性過敏反應指標		IgG慢性過敏反應指標
--	--------------------	--	--------------------




GE224 過敏原檢測報告

姓名：葉家娣

病歷號：63356

日期：2016/6/21







GE224 過敏原檢測報告

姓名：葉家娣

病歷號：63356

日期：2016/6/21

	IgE急性過敏反應指標		IgG慢性過敏反應指標
--	--------------------	--	--------------------



GE224 過敏原檢測報告

姓名：葉家娣

病歷號：63356

日期：2016/6/21

IgE急性過敏反應圖譜

IgE急性過敏反應圖譜		
重度	6級	
重度	5級	
中度	4級	
中度	3級	粉塵蟎；
輕度	2級	屋塵蟎；
輕度	1級	交錯黴菌；鰻魚；蜂蜜；

檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

1. 一般以3級以上認定為可能之過敏原，有些醫師認為2級以上就應該注意。
2. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，都應該避免食用。
3. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示在食用後兩小時內，並未誘發嚴重急性過敏症狀，仍然必須避免食用或減少服用次數。

〔註〕 即使檢測結果未顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示食用後會誘發急性過敏症狀，亦應該嚴格避免食用。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀

GE224 過敏原檢測報告

姓名：葉家娣

病歷號：63356

日期：2016/6/21

IgG慢性過敏反應圖譜

IgG慢性過敏反應圖譜		
重度	6級	黃豆；蓮子；
重度	5級	蛋白；蛋黃；花枝；鱈魚；豌豆夾；小麥；紅豆；花生；腰果；杏仁；
中度	4級	雞肉；鴨肉；蝦子；鰻魚；海帶；青椒；櫻桃；蕎麥；綠豆；胡桃核桃；
中度	3級	羊肉；蚌；鮭魚；鮪魚；花椰菜；四季豆；南瓜；蘿蔔；芒果；蘋果；香蕉；葡萄柚；芭樂；香瓜；西瓜；花豆；蜂蜜；白胡椒；枸杞；紅棗；當歸；
輕度	2級	豬肉；茄子；蘆筍；胡蘿蔔；馬鈴薯；蕃茄；洋蔥；奇異果；柑橘；椰子；木瓜；米飯；玉米；蔥；辣椒；黃耆；
輕度	1級	鵝肉；螃蟹；菠菜；高麗菜；萵苣；芹菜；小黃瓜；竹筍；鳳梨；葡萄；草莓；檸檬；水蜜桃；梨；葵花籽；薑；咖哩；香菜；甘草；熟地黃；龍眼乾；

檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

IgG慢性食物過敏後續飲食建議

1. 重度反應：建議停止攝食6個月，之後每隔4天才攝食1次。
2. 中度反應：建議停止攝食3個月，之後每隔4天攝食1次，3個月後再正常攝食。
3. 輕度反應：2級：建議每隔4天才攝食1次，3個月後正常攝食。
1級：避免每日大量食用，原則上可以安心攝食。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀